



PIENSE EN LA ENFERMEDAD SINDROME DE REYE (REYE'S SYDNROME)! ALERTA

Tanto la gripa como enfermedades similares a ella ocurren con frecuencia durante los meses de invierno. La gripe es causada por un virus y merece atención especial porque se asocia a una enfermedad infantil a veces mortal, el síndrome de Reye. Este afecta a niños desde la lactancia hasta aproximadamente los 19 años pero ninguna edad es inmune y puede aparecer de 3 a 5 días del comienzo de la varicela, un resfriado y otras infecciones virales. El síndrome de Reye afecta al cerebro e hígado, no es contagioso y a veces se confunde con la meningitis, encefalitis, diabetes, envenenamientos, sobredosis de medicinas o la muerte repentina del lactante (sudden infant death syndrome). Estudios recientes han demostrado una conexión entre el uso de aspirina y el desarrollo del Síndrome de Reye.

Después de mejorar de una infección viral, los síntomas que se describen a continuación deben tomarse seriamente, y como primeros indicios del síndrome de Reye. Consulte con su médico antes de dar aspirina a su niño, ya que el uso de aspirina está probablemente asociado a esta enfermedad, o medicinas contra las náuseas, ya que pueden ocultar los primeros síntomas en el siguiente orden:

- * vómitos persistentes y continuos
- * somnolencia, sopor
- * cambios de personalidad (niño irritable o combativo)
- * desorientación (no reconoce donde está o a sus familiares)
- * delirio, convulsiones, inconsciencia

La vida del niño depende del diagnóstico inmediato de esta enfermedad. Ella debe sospecharse en todo niño con varicela que vomita frecuentemente. Llame a su médico de inmediato si observa estos síntomas y dígame que el niño puede tener el síndrome de Reye. Si no puede comunicarse con su médico, lleve al niño al servicio de urgencia más cercano lo antes posible. Dos pruebas de función hepática (SGOT/SGPT) pueden ser indicativas de la presencia del síndrome de Reye. Si el tratamiento se instaure prontamente bajo el cuidado de personal médico especializado, cerca del 90% de los afectados se recuperan completamente.

Estudios epidemiológicos han demostrado la asociación del síndrome de Reye con el uso de aspirina para tratar enfermedades gripales, la varicela y resfriados. Si Ud. O un miembro de su familia tiene una enfermedad viral, no tome aspirina o cualquier medicina que contiene aspirina. El Cirujano General de los EE.UU., la Administración Federal de Alimentos y Medicinas (FDA), y el Centro de Control de Enfermedades (CDC) recomiendan evitar el uso de todo preparado que contenga aspirina para tratar este tipo de enfermedades en niños y adolescentes menores de 19 años. Salicilato (salicylate, acetylsalicylate, acetylsalicylic acid, salicylic acid) es otra palabra para aspirina (aspirin); algunos productos comerciales ponen en su etiqueta salicilato en vez de aspirina. Cualquiera de los dos nombres que se encuentren en las etiquetas de medicamentos se debe evitar su administración a niños o adolescentes que sufran de algún episodio febril.

El National Reye's Syndrome Foundation es una organización sin fines de lucro, exenta de impuestos con filiales en 44 estados. La tarea de la NRSF ha sido y es la de divulgar nuevos conocimientos sobre el síndrome de Reye, con el fin de ayudar a diagnosticarlo lo antes posible, a la vez que aporta fondos para la investigación de sus causas, tratamiento y prevención.

Para más información comuníquese con la fundación: National Reye's Syndrome Foundation
426 N. Lewis Street
PO Box 829
Bryan, OH 43506-0829

O LLAME AL NUMERO 1/800-233-7393 or 1/419-636-2679

E-Mail: nrsf@reyessyndrome.org
Web: www.reyessyndrome.org